ME
MPTE

te d'insectes nuisibles.

Utilisation générale et application de Tempo®

Pour les opérateurs à la lutte antiparasitaire et les éleveurs d'animaux de ferme : Suivez le mode d'emploi, mélangez avec de l'eau et appliquez à l'aide d'un pulvérisateur muni d'une pompe à main ou d'une pompe à dos à basse pression (la pression ne doit pas excéder 50 psi). Portez des vêtements protecteurs lorsque vous mélangez et appliquez le produit.

Contrôle des insectes indésirables rampants

Pour le contrôle des insectes indésirables rampants, appliquez comme vaporisation de surface ou dans les fissures où se trouvent les insectes.

Pour le contrôle des petits ténébrions mats (ténébrions – adultes et larves) dans les poulaillers, appliquez après avoir nettoyé les lieux et avant que la litière fraîche soit étendue.

Pour le contrôle des mouches, préparez un mélange à pulvériser sur toute la surface à traiter sans que le produit dégoutte ou se répande sur celle-ci.

Après l'application, gardez les bovins hors de l'étable pendant 2 heures et les volailles hors du poulailler pendant 24 heures.

Une exposition continuelle à une seule classe d'insecticide (par exemple les pyréthroïdes ou les organophosphates) peut conduire au développement d'une résistance à cette classe d'insecticide.

Afin de réduire la possibilité de résistance, il demeure important de procéder à la rotation, sur une base saisonnière, de la classe d'insecticide utilisée ou de la méthode de contrôle des organismes indésirables.

BayerTempo.ca

FER
EXEM

Garde la ferme exempt

Tempo®
Insecticide 20 WP

AHCYT006F

BAYER

Contrôle les insectes nuisibles rampants et volants dans les étables, les porcheries et les poulaillers

Lorsqu'elle est pulvérisée sur la surface des bâtiments, la poudre mouillable de cyfluthrine Tempo® 20 % laisse un résidu actif dans les fissures et sur les murs, offrant un contrôle efficace des insectes indésirables qui irritent les animaux d'élevage, répandent des maladies et réduisent les niveaux de production.

Tempo® agit rapidement

- Commence à tuer les insectes indésirables immédiatement, au contact
- Permet le retour des animaux dans le bâtiment 2 heures (bovins) et 24 heures (volailles) après l'application
- Fournit une activité résiduelle prolongée (4-6 semaines)
- Tue un large spectre d'insectes indésirables (coléoptères, mouches, fourmis)
- Offre un bon rapport coût-efficacité (1 contenant couvre 2 200 m^2 [environ 23 680 pi^2])

Insectes indésirables contrôlés par Tempo®

Insectes indésirables rampants

- Fourmis (à l'exception de la fourmi pharaon)
- Punaises des lits
- Anthrènes des tapis
- Blattes (américaine, germanique, orientale)
- Grillons
- Ténébrions ou petits ténébrions mats (adultes et larves)
- Forficules ou dermaptères (perce-oreilles)
- Thermobies
- Cloportes communs
- Araignées

Insectes nuisibles volants

- Mouches
- Moustiques
- Guêpes

Insectes nuisibles des produits en réserve et des garde-manger

Coléoptères (adultes exposés et stades immatures)

- Tribolium brun de la farine
- Trogoderme des entrepôts

Lépidoptères

- Pyrale indienne de la farine (larves seulement)

Insectes nuisibles infestant le bois

- Fourmis charpentières

Lignes directrices pour une utilisation efficace

1. Planifiez le traitement et respectez une rotation précise des insecticides utilisés, y compris Tempo®.
2. Lisez et suivez toujours le mode d'emploi.
3. Notez les dates de traitement, les produits utilisés, les numéros de lots et les doses administrées, puis rangez ces renseignements en lieu sûr.

Insecte nuisible ciblé	Directives d'application
Ténébrions	Appliquez partout où les coléoptères se posent, y compris dans les fissures et les crevasses, le long des murs de fondation. Retirez toute nourriture avant de vaporiser. Pour les surfaces, utilisez 19 grammes de Tempo® 20 WP par 100 m^2, à moins d'indications contraires. Pour une efficacité résiduelle accrue, vaporisez généreusement pour que le ruissellement puisse favoriser la formation d'un dépôt optimal.
Mouches	Pour lutter contre les mouches, appliquez aux endroits où elles se posent : l'extrémité des bâtiments, les murs latéraux, les surfaces latérales supérieures des poteaux, des traverses et des poutres. Utilisez de 9,5 à 19 grammes de Tempo® 20 WP par 100 m^2 de superficie. Vaporisez tôt le matin, lorsque les mouches sont calmes. Vaporisez une quantité suffisante d'eau pour asperger les mouches et mouiller à fond les surfaces sur lesquelles elles vont se poser, presque jusqu'au ruissellement. Il peut s'avérer nécessaire d'appliquer plusieurs traitements, et ce, à plusieurs jours d'intervalle, lorsqu'une importante éclosion de mouches survient.

Adoptez des mesures de sécurité à la ferme

Appliquez ce produit uniquement si vous possédez l'équipement de protection approuvé pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. Lavez-vous les mains après l'application. Les animaux ne doivent pas réintégrer les lieux traités moins de 2 heures après l'application et, s'il s'agit de poulaillers, moins de 24 heures après l'application. Couvrez les abreuvoirs et les auges avant l'application. Ne pulvérisez pas dans l'air.

Pour en apprendre davantage sur Tempo®, composez le 1-800-268-1432.

Tempo®

Insecticide 20 WP

BayerTempo.ca

® Bayer, la croix Bayer et Tempo sont des marques déposées de Bayer AG utilisées sous licence par Bayer Inc.